



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/ση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 153 11854 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΑΝΘΥΠ. ΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103482335 - 1366154
Φαξ: 2131527727
e-mail: dygeionomikou@astynomia.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1917/ 18/2072612

ΑΘΗΝΑ, 13/10/2018

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6023/1)

ΘΕΜΑ: «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας».**ΣΧΕΤ.:** α) Άρθρο 1, Π.Δ.584/1985 (Α'-204). β) Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846 (Β'-2315/19-6-2018).

1. Αναφέρεται-γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ανωτέρω (β) σχετικού, [πρόσφατα τροποποιημένος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)] προβλέπονται τα κάτωθι που αφορούν μέτρα πρόληψης και προαγωγής της υγείας για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας συμπεριλαμβανομένου:

« Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων, παρέχονται στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, **χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου**, τα εξής:

α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άνδρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκριμένα:

- Αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, φερριτίνης, δοκιμασίες εγκλείστων και δρεπάνωσης) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσογειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου.

- Προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς, τοξοπλάσμωσης και κυτταρομεγαλοϊού, για αποκλεισμό συγγενών λοιμώξεων.

- Υπερηχογράφημα β-επιπέδου, μία φορά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

- Λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση επί ιατρικών ενδείξεων.

- Εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο ή άλλη γνωστή γενετική διαταραχή.

-Κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού έλεγχος καρυότυπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών.

γ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από σαράντα (40) έως πενήντα (50) ετών και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών, ή σε γυναίκες άνω των τριάντα πέντε

